



DEPOLAC

Pengobatan Mastitis Masa Kering

Komposisi

Setiap ml Depolac mengandung:

Neomycin sulphate

50 mg.

Cloxacillin benzathine

100 mg.

Sifat-Sifat

Kombinasi *Cloxacillin* dan *Neomycin* bekerja sinergis dan bersifat bakterisidal. Cloxacillin efektif terhadap bakteri gram positif seperti *Staphylococcus aureus* (termasuk pembentuk enzim penicillinase), *Streptococcus agalactiae*, *S.dysgalactiae*, *S. uberis* dan *Corynebacterium pyogenes*.

Neomycin efektif terhadap bakteri gram negatif seperti *E. coli*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Salmonella* dan *Haemophilus spp.*

Depolac dibuat dalam formulasi *slow release*, sehingga obat akan tetap efektif bekerja dan dapat bertahan selama 4 minggu setelah injeksi intramamaria

Indikasi

Mencegah dan mengobati mastitis subklinis terhadap sapi masa kering yang disebabkan bakteri *Corynebacterium*, *E. coli*, *Staphylococcus* dan *Streptococcus spp.* serta bakteri lain yang peka terhadap *Cloxacillin* dan *Neomycin*.

Dosis dan Cara Pemakaian

Injeksi intramamaria.

1 syringe per kuartir ambing setelah pemerahan terakhir. Sebelum diinjeksi ambing dicuci serta didisinfeksi.

Kemasan

5 ml

No. Registrasi

DEPTAN RI No. I. 08113523 PKC

