



INTERSPECTIN-L

Mengobati CRD kompleks, *Pneumonia*, *APP*, *Colibacillosis*, *Nekrotik Enteritis*

Komposisi

Setiap ml Interspectin-L mengandung:

Lincomycin

50 mg.

Spectinomycin

100 mg.

Sifat-Sifat

Kombinasi *Linkomisin* dan *Spektinomisin* memperluas spektrum aktifitas dan bersifat sinergis. Linkomisin bersifat bakteriostatik, efektif terutama terhadap *Mycoplasma spp.* dan bakteri gram positif seperti *Clostridium*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* dan *Treponema spp.* Spektinomisin bersifat bakteriostatik, pada dosis lebih tinggi bersifat bakterisid, sangat efektif terutama terhadap *Mycoplasma spp.* dan bakteri Gram negatif seperti *Actinobacillus*, *E.coli*, *Campylobacter*, *Erysipelotrix*, *Pasteurella* dan *Salmonella spp.*

Indikasi

Interspectin-L diindikasikan untuk pengobatan terhadap CRD kompleks, *Pneumonia*, *Colibacillosis*, *Necrotic Enteritis*, *Dysentery*, *Erisipelas*, *Salmonellosis*, *Pasteurellosis*, *Staphylococcosis*, *Streptococcosis* dan infeksi saluran pencernaan dan pernapasan yang disebabkan oleh mikroorganisme lain yang peka terhadap Linkomisin dan Spektinomisin pada sapi, kambing, domba, babi, anjing, kucing dan ayam. Pencegahan kematian dini pada DOC yang disebabkan oleh Omphalitis dan infeksi bakteri *E. coli*, *Salmonella* dan *Pseudomonas*.

Dosis dan Cara Pemakaian

Pemberian secara intramuskular atau subkutan.

Sapi, kambing, domba : 1,0 ml per 10 kg berat badan.

Anjing, kucing : 1,0 ml per 5 kg berat badan.

Babi : 1,0 ml per 10 kg berat badan.

Ayam : 0,2 ml per kg berat badan.

DOC : 25 ml dicampur vaksin ND killed 1.000 dosis untuk 1.000 ekor.

Pengobatan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut.

Kemasan

Vial 100 ml

No. Registrasi

KEMENTAN RI No. I. 19013625 PKC.1

