

LEUCO-STOP®

Anti "Malaria Like" Disease

Komposisi

Setiap g LEUCO-STOP® mengandung:

Sulfamonomethoxine sodium

200 mg.

Uraian

"Malaria Like" Leucocytozoonosis adalah penyakit pada ayam yang disebabkan oleh parasit internal *Leucocytozoon sp.* yang menyerang sel darah merah dan sel darah putih. Ditularkan oleh vektor lalat *Blackfly Simulium sp* dan *Culicoides sp.* Gejala klinis yang terlihat berupa hemoragi, anemia, nafsu makan menurun, penurunan produksi telur, gangguan pertumbuhan berat badan, feces berwarna hijau daun.

LEUCO-STOP® adalah obat serbuk larut air mengandung *sulfamonomethoxine*, bekerja menghambat sintesis asam folat yang dibutuhkan dalam proses sintesis DNA sehingga menghambat pertumbuhan *Leucocytozoon* pada stadium *schizogony* yang menyebabkan kematian parasit.

LEUCO-STOP® aman diberikan pada ayam, tidak mengganggu pertumbuhan dan produksi telur jika diberikan sesuai dengan dosis dan aturan pakai.

Indikasi

LEUCO-STOP® untuk mencegah dan mengobati penyakit "Malaria Like" atau Leucocytozoonosis pada ayam.

Dosis dan Cara Pemakaian

Untuk kontrol:

- 1 g LEUCO-STOP® per 4 - 6 liter air minum
- 1 kg LEUCO-STOP® per 3 ton pakan

Diberikan selama 3 hari dalam 1 minggu, diulang selama musim lalat.

Untuk pengobatan:

- 1 g LEUCO-STOP® per 2 liter air minum
- 1 kg LEUCO-STOP® per 1 - 2 ton pakan

Diberikan selama 10 - 14 hari berturut-turut.

Waktu Henti Obat

Hewan boleh dipotong 5 hari setelah pengobatan dihentikan.

Kemasan

100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg

No. Registrasi

KEMENTAN RI No. D. 21124411 PKS.1

